




ИПМ им.М.В.Келдыша РАН • Электронная библиотека

Препринты ИПМ • Препринт № 84 за 2021 г.



ISSN 2071-2898 (Print)
ISSN 2071-2901 (Online)

В.П. Варин

Преобразование
последовательностей в
доказательствах
иррациональности
некоторых
фундаментальных констант

Рекомендуемая форма библиографической ссылки: Варин В.П. Преобразование последовательностей в доказательствах иррациональности некоторых фундаментальных констант // Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2021. № 84. 32 с.
<https://doi.org/10.20948/prepr-2021-84>
<https://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2021-84>

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОРДЕНА ЛЕНИНА ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
ИМЕНИ М.В. КЕЛДЫША

В.П. Варин

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
В ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ ИРРАЦИОНАЛЬНОСТИ
НЕКОТОРЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ КОНСТАНТ

Москва, 2021

УДК 521.1+531.314

В.П. Варин. Преобразование последовательностей в доказательствах иррациональности некоторых фундаментальных констант. Препринт Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Москва, 2021.

Преобразование числовых последовательностей (ускорение их сходимости) является одним из классических разделов численного анализа. Эти алгоритмы применяются как при решении практических задач, так и при разработке более совершенных численных методов. В то же время численные методы находят все большее применение в теории чисел. Одной из классических задач теории чисел является доказательство иррациональности фундаментальных постоянных, где скорость сходимости последовательностей рациональных чисел играет ключевую роль. Однако, насколько нам известно, не существует приложений (классических) алгоритмов ускорения сходимости к доказательствам иррациональности. Данная работа является попыткой восполнить этот пробел и привлечь внимание к этому направлению исследований.

Ключевые слова. Преобразование последовательностей, ускорение сходимости, доказательства иррациональности, высокоточные вычисления.

V.P. Varin. Sequence transformations in proofs of irrationality of some fundamental constants. Preprint of the Keldysh Institute of Applied Mathematics of RAS, Moscow, 2021.

Transformation of number sequences (convergence acceleration) is one of the classical chapters of numerical analysis. These algorithms are used both for solution of practical problems and for the development of more advanced numerical methods. At the same time, numerical methods have found numerous applications in the number theory. One of the classical problems of number theory is the proof of irrationality of some fundamental constants, where the high rate of convergence of sequences of rational numbers plays a crucial role. However, as far as we know, the applications of (classical) convergence acceleration algorithms to the proofs of irrationality do not exist. This study is an attempt to fill this gap and to draw attention to this direction of research.

Key words. Sequence transformations, acceleration of convergence, irrationality proofs, high precision computations.

© ИПМ им. М.В. Келдыша РАН.
Москва, 2021 г.

1. ВВЕДЕНИЕ

Преобразование числовых последовательностей с целью ускорения их сходимости берет свое начало, вероятно, с работ Эйлера. Один из наиболее известных (и популярных) алгоритмов ускорения сходимости – это как раз метод Эйлера. Другой не менее известный метод, который преобразует (медленно) сходящуюся последовательность в расходящийся асимптотический ряд, – это формула Эйлера-Маклорена. Эта формула также может рассматриваться как ускоритель сходимости.

Ускорение сходимости последовательностей широко применяется как при решении практических задач, так и при разработке более совершенных численных методов. Медленно сходящиеся или расходящиеся ряды часто являются решениями сложных прикладных задач, поэтому ускорение их сходимости может быть единственным способом получить содержательную информацию о решении.

В последние годы этот раздел численного анализа интенсивно развивается, что во многом связано с развитием систем компьютерной алгебры (CAS). Теперь вычисления можно проводить с очень высокой точностью в плавающей арифметике или в рациональной арифметике на обычном компьютере, что устраняет ряд ограничений, ранее казавшихся принципиальными.

В то же время численные методы, и особенно высокоточные вычисления, в последнее время находят все большее применение в теории чисел.

Разумеется, применение методов, традиционно относящихся к численному анализу в теории чисел не является чем-то новым. Как известно, Эйлер, Гаусс и другие великие математики были также виртуозными вычислителями.

Например, решение Базельской проблемы Эйлер начинал как раз с ускорения сходимости этого ряда и получения точной численной оценки величины $\zeta(2) = \pi^2/6$. Весьма вероятно, что Эйлер угадал решение этой задачи до того, как он дал доказательство.

В настоящее время суммирование рядов с высокой точностью (см. [1]), вычисление квадратур с десятками или даже сотнями десятичных разрядов, и т.п., часто используются в теории чисел для проверки некоторых гипотез и тождеств (см. [2]).

Один из классических разделов теории чисел – это доказательство иррациональности некоторых фундаментальных постоянных, где скорость сходимости последовательностей рациональных чисел играет ключевую роль. На этом фоне отсутствие (насколько нам известно) приложений классических алгоритмов ускорения сходимости последовательностей к доказательствам иррациональности кажется пробелом, который необходимо восполнить.

В данной статье мы дадим выборочный обзор некоторых весьма эффективных алгоритмов ускорения сходимости «двойного применения», а также дадим ряд примеров их приложения. С одной стороны, эти алгоритмы весьма эффективны в численном анализе, ориентированном на высокоточные вычисления. С другой стороны, применение рациональной арифметики в этих алгоритмах позволяет, в принципе, получить строгие доказательства иррациональности некоторых фундаментальных постоянных. В частности, мы покажем, что для констант $\log 2$, $\zeta(2)$ и $\zeta(3)$ доказательства иррациональности могут быть получены довольно простыми средствами.

2. УСКОРЕНИЕ СХОДИМОСТИ В СМЫСЛЕ ДИРИХЛЕ

Преобразование последовательностей мы будем понимать как применение или конструирование некоторого алгоритма, преобразующего данную последовательность рациональных чисел в другую такую последовательность, которая сходится (вообще говоря) быстрее исходной. Либо то же, но преобразующее расходящийся ряд в сходящийся.

Существует множество таких алгоритмов, применимых к различным задачам, от классического метода Эйлера до современных методов суммирования типа метода Левина (см. обзор [3]).

Весьма похожие задачи возникают в аналитической теории чисел при доказательстве иррациональности некоторых фундаментальных констант. Например, известно, что ключевым моментом в доказательстве иррациональности числа $\zeta(3)$ было построение быстро сходящейся числовой последовательности (и цепной дроби), найденной Апери (см. [4], [5]).

С тех пор как Апери дал свое весьма неожиданное для современников доказательство иррациональности числа $\zeta(3)$ (а также и $\zeta(2)$ тем же методом, см. [5]), попытки развить данный успех можно охарактеризовать как конструирование все более быстро сходящихся рациональных приближений для нужных констант с помощью все более изощренных средств.

Однако схожесть задач «ускорения сходимости» в этих столь далеких разделах математики является чисто внешней, что объясняет, почему классические алгоритмы ускорения сходимости, широко применяемые в численном анализе, не нашли (насколько нам известно) приложений в теории чисел.

Хотя сам термин «ускорение сходимости» применяется в теории чисел, однако он понимается обычно как конструирование специальной быстро сходящейся последовательности для конкретного случая. Ярким примером такого специализированного ускорения является построение цепной дроби Апери из цепной дроби Эйлера в результате серии преобразований Бауэра–Муира (см. [6]).

В отличие от обычно понимаемой скорости сходимости как, скажем, количества членов ряда, которые требуется просуммировать, чтобы получить желаемый результат, скорость сходимости в теории чисел понимается в смысле Дирихле, т.е. в смысле наилучшего диофантова приближения. Иными словами, последовательность рациональных чисел $\{p/q\}$ хорошо приближает вещественное число x , если $|p - qx|$ стремится к нулю. Поскольку знаменатели q в такой последовательности не ограничены (иначе x рационально), то необходимо, чтобы скорость сходимости измерялась величиной знаменателя q . Например,

$$\left| \frac{p}{q} - x \right| < \frac{1}{q^{1+\varepsilon}}, \quad \varepsilon > 0. \quad (1)$$

В этом случае число x должно быть иррациональным, так как в противном случае, т.е. $x = a/b$, $a, b \in \mathbb{N}$, получим последовательность натуральных чисел $|pb - qa|$, которая стремится к нулю.

Таким образом, алгоритм ускорения сходимости может быть весьма хорош в обычном практическом смысле и совершенно непригоден для ускорения сходимости в смысле Дирихле. Покажем это на примере классического алгоритма Айткена и константы Эйлера–Гомпертца (см. [7]).

Константа Эйлера–Гомпертца выражается, например, как

$$\delta = \int_0^\infty \frac{e^{-t}}{1+t} dt = \int_0^\infty e^{-t} \ln(1+t) dt = \mathbf{e} \operatorname{Ei}(1, 1) \approx 0.5963473623, \quad (2)$$

где $\operatorname{Ei}()$ – это интегральная экспонента.

Метод Айткена, как известно, точен на последовательностях $s(n)$, которые сходятся как геометрические. Поэтому данный метод имеет весьма ограниченное применение. Однако итерационный метод Айткена (см. [8, 9]) является весьма мощным ускорителем сходимости применимым также к расходящимся рядам. Последний дается рекуррентным соотношением

$$A(n, 0) = s(n),$$

$$A(n, k+1) = A(n, k) - \frac{(A(n+1, k) - A(n, k))^2}{A(n+2, k) - 2A(n+1, k) + A(n, k)}, \quad k \geq 0.$$

Последовательность $A(n, 1)$, $n = 1, 2, \dots$, соответствует обычному методу Айткена.

Как мы увидим, все имеющиеся (нелинейные) ускорители сходимости даются похожими рекуррентными схемами.

Последовательность $s(n)$ для константы Эйлера–Гомпертца имеет вид

$$s(n) = \sum_{k=0}^n (-1)^k k!, \quad (3)$$

т.е. данная последовательность быстро расходится. Тем не менее так называемая *диагональная* последовательность $\{A(0, n), n = 1, 2, \dots\}$ весьма быстро сходится к δ . Например, $|A(0, 8) - \delta| < 10^{-9}$. Следующая диагональ $A(1, n)$ сходится к δ еще быстрее. Однако $A(0, 8)$ выражается дробью, суммарное количество цифр в которой равно 10206.

В дополнение к (1) приведем два классических (и довольно малоизвестных) критерия иррациональности, которые также служат контрпримерами для двух, казалось бы, самоочевидных вещей: дроби $\{p/q\}$ в доказательстве иррациональности должны быть неприводимы; быстрее сходящаяся последовательность лучше, чем более медленно сходящаяся.

В критерии (1) мы не упомянули, что дроби $\{p/q\}$ неприводимы, т.е. p и q взаимно просты. Очевидно, что критерий (1) можно легко нарушить, если брать приводимые последовательности дробей $\{p/q\}$.

Однако, во-первых, последовательности целых чисел p и q могут генерироваться отдельно (хотя и, возможно, по одной рекуррентной формуле). Поэтому критерий (1) следует проверять для приведенной последовательности $\{p/q\}$, а она может быть неизвестна.

Во-вторых, современные CAS автоматически приводят дроби к наименьшему знаменателю, но только если p и q не слишком велики.

Классический (слегка обобщенный) критерий иррациональности Бруна (см. [10]) состоит в следующем.

Пусть дана возрастающая (убывающая) ограниченная последовательность рациональных чисел

$$\frac{p_1}{q_1}, \frac{p_2}{q_2}, \dots, \frac{p_n}{q_n}, \dots,$$

где $q_n < q_{n+1}$, $n \geq 1$. Тогда эта последовательность имеет предел, т.е. $p_n/q_n \rightarrow B$, $n \rightarrow \infty$. Пусть последовательность

$$\frac{p_2 - p_1}{q_2 - q_1}, \frac{p_3 - p_2}{q_3 - q_2}, \dots, \frac{p_{n+1} - p_n}{q_{n+1} - q_n}, \dots,$$

является убывающей (возрастающей). Тогда число B иррационально.

Данный критерий, по оценке самого Бруна, имеет весьма ограниченное применение. Однако он дает пример того, что приведение дробей может нарушить критерий иррациональности.

Рассмотрим последовательность

$$s(n) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = \left\{ 1, 2, \frac{5}{2}, \frac{8}{3}, \frac{65}{24}, \frac{163}{60}, \frac{1957}{720}, \frac{685}{252}, \frac{109601}{40320}, \frac{98641}{36288}, \dots \right\}, \quad (4)$$

которая стремится к числу e , но для которой критерий Бруна очевидно на-

рушается. Однако если взять приводимую последовательность

$$s(n) = \frac{e \Gamma(n+1, 1)}{\Gamma(n+1)} = \left\{ 1, 2, \frac{5}{2}, \frac{16}{6}, \frac{65}{24}, \frac{326}{120}, \frac{1957}{720}, \frac{13700}{5040}, \dots \right\},$$

где $\Gamma()$ – это обычная и неполная Гамма-функции, то, как показал еще сам Брун (см. [10]), критерий иррациональности Бруна выполнен.

Заметим также, что ряд (4) является разложением Энгеля для числа e (см. [11]), поэтому автоматически сходится к иррациональному числу.

Ряд (4) для числа e можно преобразовать в цепную дробь Эйлера, т.е. эквивалентную цепную дробь, подходящие дроби которой равны частичным суммам $s(n)$ в (4):

$$e = \frac{1}{1-} \frac{1}{2-} \frac{1}{3-} \frac{2}{4-} \frac{3}{5-} \frac{4}{6-} \frac{5}{7-} \dots$$

Сходимость этой цепной дроби можно ускорить стандартными средствами, например, четным *сжатием*. Эта дробь имеет вид

$$e = \frac{2}{1-} \frac{1}{4-} \frac{9}{43-} \frac{16}{13-} \frac{63}{293-} \frac{442}{139-} \frac{1925}{1886-} \dots$$

и сходится вдвое быстрее предыдущей.

Из первой дроби сразу видна иррациональность числа e по классическому критерию (Ламберта–)Лежандра (см. [12, pp. 289–296]), так как *частные дроби* (или *звенья* в русскоязычной литературе) $|a_n/b_n| < 1$. Однако вторая более быстро сходящаяся дробь не удовлетворяет этому критерию.

В более общем виде критерий Лежандра известен как теорема Титце (см. [13, p. 252]) и формулируется следующим образом.

Пусть все частные числители a_n и знаменатели b_n в цепной дроби

$$C = b_0 + \mathbf{K}_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$$

являются целыми числами. И пусть начиная с некоторого индекса n

$$\begin{cases} b_n \geq |a_n| > 0, & a_{n+1} > 0 \\ b_n \geq |a_n| + 1, & a_{n+1} < 0. \end{cases}$$

Тогда цепная дробь сходится; и число C иррационально. За исключением случая, когда начиная с некоторого индекса n

$$a_n < 0, \quad b_n = |a_n| + 1.$$

В последнем случае дробь либо несущественно расходится, либо C рационально.

Таким образом, преобразование последовательности рациональных чисел для доказательства иррациональности ее предела не следует понимать как непременно ускорение ее сходимости. Пример с числом ϵ показывает, что *растяжение* цепной дроби, т.е. замедление ее сходимости, может привести к успеху.

В заключение этого раздела приведем один курьезный случай, который служит иллюстрацией малоизвестности данного выше критерия.

На с. 226 книги [14] автор приводит со ссылкой на Лагерра две цепные дроби для константы Эйлера–Гомпертца (которая там равна $F(1)$):

$$\delta = \frac{1}{2-} \frac{1^2}{4-} \frac{2^2}{6-} \frac{3^2}{8-} \cdots = \frac{1}{1+} \frac{1}{1+} \frac{1}{1+} \frac{1}{2+} \frac{1}{1+} \frac{1}{3+} \frac{1}{1+} \cdots \quad (5)$$

Из второй дроби следует иррациональность константы Эйлера–Гомпертца по критерию Лежандра. Однако, к сожалению, вторая дробь ошибочна. Там следует заменить $2 \rightarrow 1/2$, $3 \rightarrow 1/3$, и т.д. Тогда будет правильно, но не будет критерия иррациональности.

3. ЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

Линейные преобразования последовательностей можно выразить в виде линейного оператора на множестве числовых последовательностей. Исторически такие преобразования появились значительно раньше нелинейных, и они до сих пор пользуются большой популярностью.

Мы не будем давать здесь исторического обзора и сравнительного анализа их эффективности, что можно найти в специализированной литературе, а сосредоточимся на некоторых из них, которые, по нашему мнению, могут найти применение в теории чисел.

Наиболее известным преобразованием последовательностей является, несомненно, метод Эйлера. Мы изложим обобщение этого метода и его эффективную реализацию в CAS.

Метод Эйлера обычно выводят в учебниках с помощью так называемого *Umbral Calculus*, т.е. путем формального манипулирования разностными операторами. Однако вывод этого метода с точки зрения комбинаторного преобразования последовательностей выглядит более прозрачным.

Пусть последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$, $n \in \mathbb{N}_0$, являются *биномиальными преобразованиями* друг друга, т.е.

$$a_n = \sum_{m=0}^n C(n, m) (-1)^m b_m, \quad b_n = \sum_{m=0}^n C(n, m) (-1)^m a_m,$$

где $C(n, m)$ – это биномиальный коэффициент. И пусть $A(x)$ и $B(x)$ являются

их соответствующими формальными производящими функциями, т.е.

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n,$$

тогда справедливо тождество

$$A(x) = \frac{1}{1-x} B\left(\frac{-x}{1-x}\right), \quad (6)$$

понимаемое как формальное преобразование степенных рядов.

Доказательство очевидно. Тождество (6) является инволюцией, так же как и биномиальное преобразование. Оба легко проверяются с помощью формальных манипуляций.

Если теперь подставить $x = -1$ в уравнение (6), то получим классический ускоритель сходимости Эйлера

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{2^{n+1}},$$

который справедлив для любых числовых последовательностей $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$, $n \in \mathbb{N}_0$, для которых хотя бы один из этих рядов сходится.

Иногда встречающееся в литературе утверждение, что метод Эйлера может преобразовать расходящийся ряд в сходящийся, справедливо только для исходно сходящегося степенного ряда для его суммирования, возможно, за пределами его круга сходимости, т.е. метод Эйлера не может просуммировать всюду расходящийся асимптотический ряд, что видно из инволюции (6).

Метод Эйлера можно обобщить, введя в уравнения произвольный числовой параметр p . Для этого в уравнении (6), записанном в виде рядов, нужно подставить $a_n \rightarrow a_n (-p)^n$, затем $x \rightarrow x/p$, , затем $x = -1$. В результате получим

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(1+p)^{n+1}} \sum_{m=0}^n C(n, m) p^{m+1} a_m. \quad (7)$$

Например, формула Лейбница для числа π принимает вид

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{p F([1/2, -n], [3/2], p)}{(p+1)^{n+1}},$$

где $F()$ – это гипергеометрическая функция. Для $p = 1$ эта формула принимает вид

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C(n+1/2, n)}{2^{n+1}}.$$

Этот ряд, как легко проверить, сходится значительно быстрее исходного.

Существует эффективная имплементация метода Эйлера, которая носит название преобразования Ван Вингардена (Van Wijngaarden). Однако для параметризованного метода Эйлера такое преобразование неизвестно. Приведем это обобщение.

Рассмотрим последовательности частичных сумм

$$s(n) = \sum_{k=0}^n a_k, \quad e(n) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{(1+p)^{k+1}} \sum_{j=0}^k C(k, j) p^{j+1} a_j.$$

Предполагается, что последовательность $e(n)$ стремится к тому же пределу, что и $s(n)$, но быстрее (хотя это не факт). Рассмотрим рекуррентное соотношение

$$\begin{aligned} V(n, 0) &= s(n), \\ V(n, k+1) &= \frac{(pV(n+1, k) + V(n, k))}{p+1} \quad k \geq 0. \end{aligned}$$

Тогда

$$V(-1, n+1) = e(n), \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

Доказательство можно получить с помощью математической индукции.

Заметим, что диагональные последовательности $V(k, n)$, $n \in \mathbb{N}_0$, для $k \geq 0$ стремятся (вообще говоря) к тому же пределу и, возможно, еще быстрее (что справедливо для ряда Лейбница).

Закончим с методом Эйлера тем, что выведем одно ранее (вероятно) неизвестное комбинаторное тождество.

Тождество (7) на самом деле не зависит от p . Поэтому продифференцируем его по p и упростим. В результате получим тождество

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1) \sum_{m=0}^n C(n, m) p^{m+1} a_m}{(1+p)^{n+2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sum_{m=0}^n C(n, m) p^m (m+1) a_m}{(1+p)^{n+1}},$$

справедливое (если ряды сходятся) для любого числа p и любой последовательности $\{a_n\}$. Это тождество, разумеется, также можно дифференцировать.

Другой весьма популярный линейный метод ускорения сходимости – это экстраполяция Ричардсона (см. [3]). Мы изложим его в форме (предложенной Невиллем [15]), удобной для реализации в CAS.

Пусть дана последовательность $s(n)$, сходимость которой требуется ускорить. Выбирается монотонная последовательность $t(n) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, которая моделирует скорость сходимости $s(n)$. Последовательность $t(n)$ можно рассматривать как условное «время», которое измеряет близость величины $s(n)$ к своему пределу в зависимости от близости величины $t(n)$ к нулю. Рассмотрим рекуррентное соотношение

$$R(n, 0) = s(n),$$

$$R(n, k) = \frac{t(n+k)R(n, k-1) - t(n)R(n+1, k-1)}{t(n+k) - t(n)}, \quad k > 0.$$

Последнюю формулу легко модифицировать так, чтобы $t(n) \rightarrow \infty$.

Пусть, например, $s(n) = P(t(n))$, где $P(x) = a_m x^m + \dots + a_1 x + a_0$ — это полином степени m . Тогда, как легко проверить, для любой последовательности $t(n)$, $R(n, k) \equiv a_0$ при $k \geq m$ и $n \in \mathbb{N}$.

Иными словами, метод Ричардсона точен на полиномиальных последовательностях в указанном смысле. Поэтому, если последовательность $s(n)$ хорошо приближается такими последовательностями, и если удачно подобрать время $t(n)$, то последовательности $R(n, m)$, $n, m \in \mathbb{N}$, могут весьма быстро сходиться.

Рассмотрим, например, последовательности частичных сумм для ряда Лейбница

$$s(n) = \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}, \quad t(n) = \frac{1}{2n+1},$$

где суммирование ведется до $2n$, так как исходный ряд знакопеременный. Тогда

$$R(0, 10) = \frac{1858842414038186176}{2366751668870964375}, \quad \left| \frac{\pi}{4} - R(0, 10) \right| < 0.4 \times 10^{-10}.$$

Метод Ричардсона, как и другие методы, рассмотренные ниже, весьма чувствителен к выбору времени $t(n)$, т.е. вспомогательной последовательности. Это относится как к скорости сходимости в обычном смысле, так и к скорости сходимости в смысле Дирихле. Никаких правил выбора $t(n)$, насколько нам известно, не существует.

Приведем пример, показывающий чувствительность метода Ричардсона к выбору вспомогательной последовательности $t(n)$.

Последовательность $H(n) - \ln n$, $n \rightarrow \infty$, стремится к константе Эйлера γ , где $H(n)$ — это гармоническое число. Поэтому и $H(n^2) - 2 \ln n \rightarrow \gamma$. Таким образом, получаем последовательность рациональных чисел $2H(n) - H(n^2) = \gamma + O(1/n)$. На самом деле, удобнее взять последовательность

$$2H(n) - H(n^2 + n) = \gamma + O(1/n^2). \quad (8)$$

Исходя из данной асимптотической оценки возьмем $t(n) = 1/n^2$. Тогда получим

$$|\gamma - R(1, 10)| < 0.56 \times 10^{-6},$$

где числитель и знаменатель числа $R(1, 10)$ состоят из 74 цифр.

Теперь возьмем время $t(n) = 1/n/(n+1)$, которое имеет примерно ту же асимптотику. Тогда получим

$$|\gamma - R(1, 10)| < 0.41 \times 10^{-15}, \quad (9)$$

где числитель и знаменатель числа $R(1, 10)$ состоят из 72 цифр.

Такую же точность аппроксимации можно получить в плавающей арифметике для исходной последовательности $H(n) - \ln n$ или, что лучше, для $H(n) - \ln(n+1/2)$.

Метод Ричардсона, по-видимому, также не может просуммировать всюду расходящийся асимптотический ряд, хотя строгое доказательство этого, вероятно, отсутствует.

Рассмотрим два метода преобразования последовательностей, которые, в некотором смысле, дополняют друг друга.

Метод Эйлера–Маклорена (см. [16, р. 518]) суммирования рядов весьма эффективен в численном анализе, хотя он переводит (вообще говоря) сходящиеся ряды в расходящиеся асимптотические. Например,

$$H(n) - \ln n = \gamma - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B(k)}{k n^k}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad (10)$$

где $B(n)$ – это числа Бернулли, и равенство следует понимать в асимптотическом смысле.

Аналогичные формулы выражают значения $\zeta(n)$, $n = 2, 3, \dots$, в виде асимптотических разложений полигамма функций (см. [17]).

Расходящиеся асимптотические ряды, полученные с помощью формулы Эйлера–Маклорена, могут быть отправлены на вторичную переработку и преобразованы в сходящиеся (см. ниже).

Напомним, что числа Стирлинга первого и второго рода, $S_1(n, m)$, $S_2(n, m)$, определяются следующими тождествами

$$(x)_n = \sum_{m=0}^n (-1)^{n+m} S_1(n, m) x^m, \quad x^n = \sum_{m=0}^n (-1)^{n+m} S_2(n, m) (x)_m, \quad (11)$$

где

$$(x)_n = \frac{\Gamma(x+n)}{\Gamma(x)} = \prod_{k=0}^{n-1} (x+k), \quad n \in \mathbb{N}_0,$$

это символ Почхаммера (или *восходящий факториал*).

Один из (малоизвестных) способов преобразовать расходящийся ряд в сходящийся – это классическое факториальное преобразование (см. [18], [19]). Дадим его в более удобной форме.

Пусть последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$, $n \in \mathbb{N}_0$, являются *преобразованиями Стирлинга* друг друга, т.е.

$$a_n = \sum_{m=0}^n S_2(n, m) (-1)^{n+m} b_m, \quad b_n = \sum_{m=0}^n S_1(n, m) (-1)^{n+m} a_m.$$

Тогда справедливо тождество

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{x^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{(1+x)_n}, \quad (12)$$

которое следует понимать в асимптотическом смысле, т.е. обе части (12) имеют одно и то же асимптотическое разложение в правой полуплоскости.

Тождество (12) можно обобщить так же, как мы это сделали с преобразованием Эйлера, т.е. ввести в него произвольный параметр p .

Формула (12) преобразует (вообще говоря) расходящийся асимптотический ряд слева в (12) в (вообще говоря) сходящийся ряд в некоторой полуплоскости $R < \operatorname{Re}(x)$, $0 \leq R < \infty$ (см. [18], [19]). Таким образом, формула (12) является, в некотором роде, альтернативой теории моментов Стилтеса, которая обосновывает преобразование асимптотических рядов в сходящиеся цепные дроби и Паде-аппроксимации (см. [20]).

Ряд примеров суммирования расходящихся рядов с помощью факториального преобразования (12) можно найти в [17]. Приведем пример для константы Эйлера–Гомпертца. Асимптотический ряд для нее имеет вид

$$\int_0^{\infty} \frac{x \exp(-t)}{x+t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n!}{x^n}. \quad (13)$$

Эйлер, как известно, просуммировал этот ряд с помощью преобразования в цепную дробь (см. [21]).

Возьмем $x = 1$ в (12) и (13). Тогда получим

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n! = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)!} \sum_{m=0}^n S_1(n, m) m!. \quad (14)$$

Теперь нужно доказать, что ряд справа в (14) сходится, причем к константе δ . Рассмотрим вспомогательный ряд

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-z)^n}{(n+1)!} \sum_{m=0}^n S_1(n, m) m!, \quad z > 0.$$

С помощью энциклопедии целых последовательностей [22] получаем

$$f(z) = \int_0^z \frac{dt}{1 - \ln(1-t)} = e (\operatorname{Ei}(1, 1) - \operatorname{Ei}(1, 1 - \ln(1-z))). \quad (15)$$

Поэтому $f(1) = \delta$. Заметим также, что последний интеграл можно получить с помощью замен переменных из определения δ в (2).

Формула (12) является переформулировкой ($x \rightarrow 1/x$) факториального преобразования, рассмотренного в [17]. Приведем другое, как мы полагаем, более удобное преобразование расходящихся асимптотических рядов в сходящиеся.

Пусть последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$, $n \in \mathbb{N}_0$, являются преобразованиями типа Стирлинга друг друга, т.е. $a_0 = b_0$, и

$$a_n = \sum_{m=1}^n S_2(n-1, m-1) (-1)^{n+m} b_m, \quad b_n = \sum_{m=1}^n S_1(n-1, m-1) (-1)^{n+m} a_m.$$

Тот факт, что эти преобразования инволютивны, как и традиционные преобразования Стирлинга, легко проверяем. Тогда справедливо асимптотическое тождество

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{x^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{(x)_n}, \quad (16)$$

которое следует понимать так же, как и тождество (12), т.е. обе части (16) имеют одно и то же асимптотическое разложение при $0 < x \rightarrow \infty$.

Тождество (16) не эквивалентно формуле (12), хотя доказывается сходным образом (см. [17]). Насколько нам известно, формула (16), как и данные выше преобразования типа Стирлинга, ранее не публиковались. Формула (16) удобна тем, что при подстановке $x = 1$ в ее правую часть получим тейлоровские коэффициенты некоторой экспоненциальной производящей функции (так как $(1)_n = n!$, $n \in \mathbb{N}_0$).

Применим формулу (16) к асимптотическому ряду (13) для константы Эйлера–Гомпертца. Имеем $a_n = (-1)^n n!$, $n \in \mathbb{N}_0$, и

$$\{b_n\} = \{1, -1, 2, -4, 10, -30, 108, -444, 2112, -11040, 65712, \dots\}.$$

Положим $x = 1$ в (16), тогда получим

$$\delta = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{n!}. \quad (17)$$

Теперь нужно доказать, что ряд в (17) сходится, причем к константе δ . Рассмотрим вспомогательный ряд

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{n!} z^n, \quad z > 0.$$

С помощью энциклопедии целых последовательностей [22] получаем

$$f(z) = 1 - \int_0^z \frac{dt}{(1 - \ln(1-t))^2} = e(\text{Ei}(1, 1) - \text{Ei}(1, 1 - \ln(1-z))) + \frac{1-z}{1 - \ln(1-z)}.$$

Поэтому $\lim_{z \nearrow 1} f(z) = \delta$. Последнее тождество можно также вывести интегрированием по частям тождества (15).

Применим преобразование (16) для вычисления константы Эйлера по формуле (10). Для этого более удобно взять второй комплект чисел Бернулли, в котором $B(1) = 1/2$, а не $B(1) = -1/2$. Напомним, что первый комплект чисел Бернулли – это значения $B(n) = B_n(0)$, а второй – это значения $B(n) = B_n(1)$, где $B_n(x)$ – это полиномы Бернулли. Эти два комплекта являются биномиальными преобразованиями друг друга.

Подставим $n = 1$ в (10), тогда получим тождество (полученное Эйлером)

$$\gamma = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B(k)}{k}. \quad (18)$$

Последнее равенство является своего рода «слепком» с хорошо известного асимптотического тождества

$$\ln(x) - \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{B(n)}{n x^n}, \quad x \rightarrow +\infty,$$

где $\psi(x) = (\ln \Gamma(x))'$ – это дигамма-функция.

Имеем $a_n = B(n)/n$, $n \in \mathbb{N}$, и

$$\{b_n\} = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{12}, \frac{1}{12}, \frac{19}{120}, \frac{9}{20}, \frac{863}{504}, \frac{1375}{168}, \frac{33953}{720}, \frac{57281}{180}, \dots \right\}.$$

Положим $x = 1$ в (16), тогда получим

$$\gamma = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{n!}. \quad (19)$$

Теперь нужно доказать, что ряд в (19) сходится, причем к константе Эйлера γ . Рассмотрим вспомогательный ряд

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{n!} z^n, \quad z > 0.$$

С помощью энциклопедии целых последовательностей [22] получаем

$$f(z) = \int_0^z \left(\frac{1}{t} + \frac{1}{\ln(1-t)} \right) dt = \gamma + \ln(z) + \text{Ei}(1, -\ln(1-z)). \quad (20)$$

Поэтому $\lim_{z \nearrow 1} f(z) = \gamma$.

Последнее тождество является обобщением известной формулы для константы γ (см. [23]), которая применялась (см. [24]) в ошибочном (см. [25]) доказательстве иррациональности константы Эйлера. Однако в [24] была получена правильная формула для коэффициентов разложения подынтегрального выражения в (20) в степенной ряд. Сравнивая эту формулу с нашим

преобразованием, получаем (по-видимому) неизвестное ранее комбинаторное тождество

$$\sum_{m=1}^n \frac{S_1(n-1, m-1) (-1)^{m+1} B(m)}{m} = \frac{1}{n} \sum_{m=1}^n \frac{S_1(n, m)}{m+1}, \quad n, m \in \mathbb{N},$$

из которого находим

$$B(n) = n \sum_{m=1}^n \frac{S_2(n-1, m-1) (-1)^{n+1}}{m} \sum_{k=1}^m \frac{S_1(m, k)}{k+1}.$$

Пример с суммированием ряда Эйлера (18) для константы γ показывает, что формула (16) имеет некоторые преимущества по сравнению с классическим факториальным преобразованием (12), так как мы не смогли получить с помощью последнего что-либо содержательное для константы γ .

Формулы (12) и (16) вместе с соответствующими преобразованиями Стирлинга могут рассматриваться как простое преобразование асимптотического ряда

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{x^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{(1+x)^n}. \quad (21)$$

Однако для последнего существует гораздо более простое преобразование типа биномиального, т.е. $a_0 = c_0$, и

$$c_n = \sum_{m=1}^n C(n-1, m-1) a_m, \quad a_n = \sum_{m=1}^n C(n-1, m-1) (-1)^{n+m} c_m,$$

что легко проверяется.

Например, если взять в (21) $a_n = (-1)^n / (n+1)$, и $x = 1$, то получим

$$\ln 2 = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)2^n},$$

т.е. вариант формулы суммирования Эйлера, с которой мы начали этот раздел.

Приведем одно весьма полезное (но редко используемое) тождество

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} C\left(\frac{x-a}{h}, k\right) \sum_{j=0}^k (-1)^{k+j} C(k, j) f(a+jh), \quad (22)$$

которое представляет собой ряд Ньютона, или сумму прямых (при $h > 0$), либо обратных (при $h < 0$) конечных разностей. Здесь a – это произвольный вещественный параметр. При конечном суммировании rhs(22) – это интерполяционный полином Ньютона.

При $h \rightarrow 0$ формула (22) дает обычный ряд Тейлора в точке $x = a$.

Формула (22) может давать как сходящиеся ряды, т.е. разложения гладкой функции $f(x)$, так и расходящиеся асимптотические ряды.

Приведем пример использования ряда Ньютона для вычисления константы Эйлера–Гомпертца. Напомним, что

$$\{\mathbf{e}\Gamma(n, 1)\} = \{\delta, 1, 2, 5, 16, 65, 326, 1957, 13700, 109601, \dots\}, \quad n \in \mathbb{N}_0,$$

т.е. для $f(x) = \mathbf{e}\Gamma(x, 1)$ значения $f(x)$ целочисленны при $x \in \mathbb{N}$. Причем они вычисляются по простой рекуррентной формуле, $f(n) = (n-1)f(n-1) + 1$. Так как $f(0) = \delta$, то можно (попытаться) экстраполировать значения $f(n)$ в натуральных числа в число 0, т.е. выразить δ рядом Ньютона.

Для этого сначала подставим в (22) $h = 1$ (шаг интерполяции) и $a = 1$, а затем $x = 0$. Тогда получим

$$f(0) = \delta = \sum_{k=0}^{\infty} C(-1, k) \sum_{j=0}^k (-1)^{k+j} C(k, j) f(j+1) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k k!,$$

т.е. мы получили исходный асимптотический ряд для δ .

Теперь возьмем $h = 1$, $a = 2$, а затем $x = 0$. Тогда получим

$$\delta = \sum_{k=0}^{\infty} C(-2, k) \sum_{j=0}^k (-1)^{k+j} C(k, j) f(j+2) = \sum_{k=2}^{\infty} (-1)^k k!,$$

т.е. мы получили асимптотический ряд для δ , который отличается от исходного отсутствием первых двух членов. Этот, казалось бы, парадоксальный результат объясняется очень просто:

$$\delta = \int_0^{\infty} \frac{\mathbf{e}^{-t}}{1+t} dt = \int_0^{\infty} \frac{t^2 \mathbf{e}^{-t}}{1+t} dt,$$

что легко проверяется интегрированием по частям.

Таким образом можно получить целую серию новых асимптотических разложений (и цепных дробей) для константы Эйлера–Гомпертца. Например, при $h = 1$, $a = 3$, получим

$$\delta = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (k^2 + 5k + 5) (k+2)!.$$

Однако формула (22) может давать и сходящиеся ряды для константы δ . Возьмем, например, $f(x) = \mathbf{e}\Gamma(x, 1)/\Gamma(x+1)$. Далее, как и раньше, положим $h = 1$, $a = 1$. Тогда получим

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} C(x-1, k) \sum_{j=0}^k (-1)^{k+j} C(k, j) f(j+1).$$

Подстановка $x = 0$ в последнюю формулу дает (после некоторого исследования)

$$\delta = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{L(k, 1)}{k+1}, \quad (23)$$

где $L(n, x)$ – это полином Лагерра. Напомним, что

$$L(k, 1) = \sum_{j=0}^k \frac{(-k)_j}{(j!)^2}.$$

Для значений полиномов Лагерра в $x = 1$ существует довольно сложная асимптотическая формула, которую мы опускаем. Из нее следует, что $L(k, 1)/(k+1) = O(1/k^{5/4})$, т.е. ряд (23) сходится, хотя и медленно.

Заметим, что полиномы Лагерра регулярно появляются при исследовании константы Эйлера–Гомпертца (см., например, [26]).

В завершение этого раздела вернемся к функции $f(x) = \mathbf{e} \Gamma(x, 1)$ с ее рекуррентной формулой $f(n) = (n-1)f(n-1) + 1$. Эту рекурсию легко записать в виде трехзвенного линейного однородного соотношения, т.е.

$$f(n+1) = (n+1)f(n) - (n-1)f(n-1), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Действуя классическим способом, преобразуем эту рекурсию в цепную дробь. Получаем тождество ($n \rightarrow x$)

$$\frac{\Gamma(x+1, 1)}{\Gamma(x, 1)} = \frac{x}{x+2 - \frac{x+1}{x+3 - \frac{x+2}{x+4 - \frac{x+3}{x+5 - \frac{\Gamma(x+5, 1)}{\Gamma(x+4, 1)}}}}}, \quad (24)$$

которое, очевидно, можно продолжить неограниченно, и которое справедливо во всей комплексной плоскости. При $x = 0$, lhs(24) равна $1/\delta$, а rhs(24) стремится к этому пределу при $x \rightarrow 0$.

Многие известные разложения в цепные дроби получены подобным образом из трехзвенных линейных рекурсий. Кажется очевидным, что полученная таким образом бесконечная цепная дробь (которая сходится по крайней мере при $\operatorname{Re}(x) > 0$) дает разложение lhs(24), но это не так.

В самом деле, при $x = n \in \mathbb{N}$, lhs(24) – это рациональное число, а rhs(24) – это всегда иррациональное число согласно критерию Лежандра (или Титце, см. [13, р. 252]). Например, при $x = 1$, rhs(24) = $(\mathbf{e} - 2)/(\mathbf{e} - 1)$, причем сходимость очень быстрая.

Как известно, сходимость и расходимость ряда и представляющей его цепной дроби могут сильно различаться по своим свойствам. Например, степенной ряд может расходиться, а его цепная дробь сходиться (см. [21] для δ). Или цепная дробь может расходиться. Или ряд и его цепная дробь могут сходиться, но иметь разные области сходимости.

Хованский [27, с. 30] со ссылкой на Перрона [13] указал, что если ряд и его цепная дробь сходятся, то их сходимость к одному пределу, вообще говоря, не гарантирована, т.е. это открытая проблема.

Но что касается трехзвенных линейных соотношений, то для них существует ряд достаточных условий сходимости бесконечной цепной дроби к нужному пределу (см. [13, р. 289]). Для цепной дроби (24) эти условия, очевидно, не выполнены.

Тем не менее цепные дроби, полученные таким образом, могут давать эффективные рациональные аппроксимации нужных функций, если использовать их как *модифицированные* цепные дроби (см. [28]), т.е., например, заменить функциональную часть в rhs(24) на ее асимптотику.

4. НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

Линейные преобразования последовательностей, рассмотренные в предыдущем разделе, весьма эффективны для ускорения сходимости в обычном смысле. Нам не удалось построить с их помощью пример ускорения сходимости в смысле Дирихле так, чтобы выполнялся критерий (1). Однако это не означает, что такой пример не существует.

В данном разделе мы рассмотрим некоторые нелинейные ускорители сходимости и дадим их эффективную реализацию.

Наиболее популярным (и разрекламированным) таким ускорителем является метод Левина (см. [29, р. 214]). Если пользователь в CAS вычисляет сумму бесконечного ряда, то система с большой вероятностью будет использовать метод Левина.

Однако сам этот алгоритм реализован в CAS в плавающей арифметике и скрыт от пользователя, а имеющиеся в открытом доступе алгоритмы весьма громоздки и также используют плавающую арифметику.

Поэтому мы дадим простой вариант метода Левина, пригодный для численного экспериментирования в рациональной (и плавающей) арифметике. Это же относится и к другим алгоритмам в этом разделе.

Теоретические основы метода Левина изложены в специализированной литературе (см., например, [30, р. 189]). Пусть дана числовая последовательность $s(n)$, $n \in \mathbb{N}_0$. Выбирается вспомогательная последовательность $\omega(n)$ и параметр β (мы используем стандартные обозначения). Строится двумерная

таблица $L(n, k) = L_1(n, k)/L_2(n, k)$, где

$$L_1(n, k) = \sum_{j=0}^k \frac{(-1)^j C(k, j) (\beta + n + j)^{k-1} s(n + j)}{(\beta + n + k)^{k-1} \omega(n + j)},$$

$$L_2(n, k) = \sum_{j=0}^k \frac{(-1)^j C(k, j) (\beta + n + j)^{k-1}}{(\beta + n + k)^{k-1} \omega(n + j)}.$$

Заметим, что в этой стандартной форме метода Левина общий множитель $(\beta + n + k)^{k-1}$ в знаменателе сокращается. Он нужен лишь для нормализации вычислений в плавающей арифметике с фиксированной разрядной сеткой. Если же разрядность можно увеличивать или вычисления проводятся в рациональной арифметике, то данный алгоритм можно значительно упростить:

$$L_1(n, 0) = \frac{s(n)}{(\beta + n) \omega(n)},$$

$$L_1(n, k) = (\beta + n + k) L_1(n + 1, k - 1) - (\beta + n) L_1(n, k - 1), \quad k > 0$$

$$L_2(n, 0) = \frac{1}{(\beta + n) \omega(n)},$$

$$L_2(n, k) = (\beta + n + k) L_2(n + 1, k - 1) - (\beta + n) L_2(n, k - 1), \quad k > 0.$$

Вспомогательная последовательность $\omega(n)$ и параметр β выбираются из чисто эмпирических соображений с учетом имеющейся информации (или гипотез) об асимптотике исходной последовательности. Как и ранее, диагональные последовательности $L(k, n)$ при фиксированном k и $n \in \mathbb{N}$ дают (вообще говоря) хорошие приближения к пределу последовательности $s(n)$.

Основное достоинство метода Левина – это его универсальность. Он может суммировать как монотонные последовательности или знакопеременные сходящиеся ряды, так и знакопеременные расходящиеся ряды. Однако помимо этой последней возможности нам не удалось выявить преимущества этого метода по сравнению даже с методом Ричардсона для ускорения сходимости в обычном смысле.

Что касается ускорения сходимости в смысле Дирихле, то, по нашему мнению, этот метод уступает всем изложенным в этом разделе. Хотя этот вывод основан на ограниченном опыте.

Существует модификация метода Левина (см. [8, 9]). В тех же обозначениях двумерная таблица $U(n, k) = U_1(n, k)/U_2(n, k)$ строится следующим образом

$$U_1(n, k) = \sum_{j=0}^k \frac{(-1)^j C(k, j) (\beta + n + j + 1)_{k-1} s(n + j)}{(\beta + n + k + 1)_{k-1} \omega(n + j)},$$

$$U_2(n, k) = \sum_{j=0}^k \frac{(-1)^j C(k, j) (\beta + n + j + 1)_{k-1}}{(\beta + n + k + 1)_{k-1} \omega(n + j)}.$$

Здесь степени $(\beta+n+k)^{k-1}$ и т.п. заменены на символы Почхаммера. Данный алгоритм можно также значительно упростить:

$$U_1(n, 0) = \frac{s(n)}{(\beta+n)\omega(n)},$$

$$U_1(n, k+1) = (\beta+n+2k+1)U_1(n+1, k) - (\beta+n+k)U_1(n, k), \quad k > 0,$$

$$U_2(n, 0) = \frac{1}{(\beta+n)\omega(n)},$$

$$U_2(n, k+1) = (\beta+n+2k+1)U_2(n+1, k) - (\beta+n+k)U_2(n, k), \quad k > 0.$$

Например, возьмем последовательность (3) для константы Эйлера–Гомпертца. Выберем для нее $\beta = -1$ и $\omega(n) = (-1)^n (n+1)!$. Тогда получим (по явному алгоритму)

$$\{U(0, n)\} = \left\{ \frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{8}{13}, \frac{28}{47}, \frac{400}{671}, \frac{65}{109}, \frac{28660}{48059}, \frac{2035540}{3413339}, \frac{1202644}{2016683}, \dots \right\},$$

причем

$$U(0, 10) = \frac{29486180}{49444639}, \quad |\delta - U(0, 10)| < 1.0 \times 10^{-10}.$$

Заметим, что в этой последовательности рациональных приближений

$$|\delta \operatorname{den}(U(0, n)) - \operatorname{num}(U(0, n))| < 1, \quad n < 11,$$

за исключением $n = 8$. Далее, к сожалению, эта закономерность не сохраняется.

Заметим также, что при выбранных начальных данных рекурсивный алгоритм не работает, так как $\beta+n=0$ при $n=1$ в знаменателе. Однако это устранимая особенность, и при других параметрах эти алгоритмы эквивалентны.

Перейдем к изложению двух родственных методов, предложенных Винном (Wynn), и которые дополняют друг друга. Это так называемые ε - и ρ -алгоритмы. Как и ранее, мы отсылаем читателя к специализированной литературе по теоретическим основам этих методов. Они имеют огромную библиографию (см., например, [30]).

Пусть даны формальный ряд и последовательность его частичных сумм

$$s = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k, \quad s(n) = \sum_{k=0}^n a_k x^k.$$

Для ε -алгоритма положим

$$W(n, k) = 0, \quad k < 0, \quad W(n, 0) = s(n),$$

$$W(n, k+1) = W(n+1, k-1) + \frac{1}{W(n+1, k) - W(n, k)}, \quad k \geq 0,$$

тогда величины $W(j, n)$ для нечетных n являются вспомогательными, и

$$W(j, 2n) = P[n + j, n](s), \quad j \geq 0, \quad n \in \mathbb{N}_0,$$

где $P[n + j, n](s)$ – это диагональ Паде-таблицы, т.е. рациональные аппроксимации формального ряда s в виде отношения полиномов степени $n + j$ и n , таких, что

$$s - P[n + j, n](s) = O(x^{2n+j+1}).$$

Таким образом, ε -алгоритм дает верхнюю часть Паде-таблицы. Данное утверждение – это теорема 1 в [31].

Приведем дополнение к этому утверждению, которое легко проверяется, но отсутствует в литературе (насколько нам известно). При тех же условиях,

$$W(-1, 2n) = P[n - 1, n](s), \quad n \in \mathbb{N},$$

т.е. ε -алгоритм дает также одну нижнюю диагональ Паде-таблицы.

Величины $W(j, n)$, $j < -1$ в этом алгоритме не имеют смысла. Однако если рассмотреть ряд $1/s$, т.е. обратный к s , то ε -алгоритм даст также и нижнюю часть Паде-таблицы для s .

Применим ε -алгоритм для последовательности (3), т.е. вычислим константу Эйлера–Гомпертца. Численный эксперимент показывает, что все диагональные последовательности $W(j, 2n)$, $j \geq -1$ сходятся к этой константе, но медленно. Например,

$$W(0, 20) - \delta \approx 0.0000315214, \quad W(1, 20) - \delta \approx -0.0000365738, \dots$$

Однако (относительно) медленно сходящаяся последовательность также может быть полезна, если известна общая формула для ее членов.

Закономерности в последовательности рациональных чисел часто бывают видны, если преобразовать ее в цепную дробь Эйлера (известную еще Д. Бернулли). Пусть дана сходящаяся последовательность $s(n)$. Рассмотрим ее как последовательность $s(n) = p_n/q_n$ подходящих дробей. Вычислим

$$\begin{aligned} a_1 &= p_1, & a_n &= \frac{p_{n-1}q_n - p_nq_{n-1}}{p_{n-1}q_{n-2} - p_{n-2}q_{n-1}}, \quad n > 1, \\ b_1 &= q_1, & b_n &= \frac{p_nq_{n-2} - p_{n-2}q_n}{p_{n-1}q_{n-2} - p_{n-2}q_{n-1}}, \quad n > 1, \end{aligned}$$

где $p_0 = 0$ и $q_0 = 1$. Тогда

$$s(n) = \mathbf{K}_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k}.$$

Рассмотрим теперь сходящиеся последовательности $s_k(n) = W(k, 2n)$, которые получаются по ε -алгоритму для константы Эйлера–Гомпертца.

Для $s_1(n)$ получим в точности цепную дробь (5). Заметим, что это, по сути, единственная цепная дробь для константы δ , известная в настоящее время. Она приведена в Википедии. Вторая дробь для δ в Википедии, а также в [7], является ее растяжением. Четные сжатия дроби (5) рассматривались в [26, (1)]. Ее подходящие дроби выражаются с помощью полиномов Лагерра.

Таким образом, хотя сам ε -алгоритм является существенно нелинейным, полученные последовательности рациональных приближений нужных констант могут выражаться с помощью линейных рекурсий или даже в явном виде.

Дадим еще две цепные дроби для δ , полученные по этому алгоритму.

Последовательность $s_0(n) = W(0, 2n)$, т.е. главная диагональ, несколько лучше приближает δ (и с другим знаком невязки). Цепная дробь для нее (после преобразования к эквивалентной) имеет вид

$$\delta = \frac{2}{3+} \frac{1}{4-} \frac{6}{7-} \frac{12}{9-} \frac{20}{11-} \frac{30}{13-} \frac{42}{15-} \frac{56}{17-} \dots$$

Для последовательности $s_2(n) = W(2, 2n)$ цепная дробь имеет вид

$$\delta = \frac{4}{5+} \frac{6}{5-} \frac{10}{9-} \frac{18}{11-} \frac{28}{13-} \frac{40}{15-} \frac{64}{17-} \frac{70}{19-} \dots$$

Любопытно, что для данного асимптотического ряда, т.е. для (13), последовательности над- и поддиагональных Паде-аппроксимаций дают один и тот же ряд рациональных приближений, т.е. $W(-1, 2n)|_{x=1} = W(1, 2n)|_{x=1}$, $n \in \mathbb{N}_0$. В общем случае это, разумеется, неверно.

Применим теперь ε -алгоритм для вычисления $\ln 2$ по простейшему ряду

$$\ln 2 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+1}. \quad s(n) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1}.$$

Для диагональных Паде-аппроксимаций $s_0(n) = W(0, 2n)$, $n > 0$, получим

$$\{s_0(n)\} = \left\{ \frac{7}{10}, \frac{52}{75}, \frac{1073}{1548}, \frac{14161}{20430}, \frac{37981}{54795}, \frac{192383}{277550}, \frac{4213309}{6078520}, \frac{522636731}{754005420}, \dots \right\},$$

причем

$$\begin{aligned} |\text{num}(s_0(10)) - \text{den}(s_0(10)) \ln 2| &< 0.000025, \\ |\text{num}(s_0(40)) - \text{den}(s_0(40)) \ln 2| &< 0.35 \times 10^{-15}, \dots \end{aligned}$$

т.е. мы получили ускорение сходимости в смысле Дирихле так, что критерий (1) выполнен. Это же относится к другим диагональным аппроксимациям.

Однако это пока что экспериментальный факт, для доказательства которого необходимо выявить закономерности в этих рядах рациональных чисел.

После того как закономерности обнаружены, их доказательство можно, в принципе, получить с помощью математической индукции.

В данном случае эти закономерности лучше наблюдаются в поддиагональной последовательности $s_{-1}(n) = W(-1, 2n)$. Для нее получим

$$\{s_{-1}(n)\} = \left\{ \frac{2}{3}, \frac{8}{13}, \frac{131}{189}, \frac{445}{642}, \frac{34997}{50490}, \frac{62307}{62307}, \frac{2359979}{3404730}, \frac{25786503}{37202060}, \dots \right\}, \quad n > 0,$$

причем

$$\begin{aligned} |\text{num}(s_{-1}(10)) - \text{den}(s_{-1}(10)) \ln 2| &< 0.25 \times 10^{-6}, \\ |\text{num}(s_{-1}(40)) - \text{den}(s_{-1}(40)) \ln 2| &< 0.69 \times 10^{-17}, \dots \end{aligned}$$

Цепная дробь для $s_{-1}(n)$ (после преобразования к эквивалентной) имеет вид

$$\ln 2 = \frac{2}{3-} \frac{1}{9-} \frac{4}{15-} \frac{3}{7-} \frac{16}{81-} \frac{25}{11-} \frac{4}{13-} \frac{49}{135-} \frac{64}{17-} \frac{9}{19-} \frac{100}{189-} \frac{121}{23-} \dots$$

В данной цепной дроби для $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} a_{3n+2} &= -(3n+1)^2, & a_{3n+3} &= -(3n+2)^2, & a_{3n+4} &= -(n+1)^2, \\ b_{3n+1} &= (6n+1), & b_{3n+2} &= (54n+27), & b_{3n+3} &= (6n+5), \end{aligned}$$

т.е. после начального отрезка длины 4 структура дроби «квазипериодична» с периодом 3.

Заметим, что эту же цепную дробь (за исключением начального куска) можно получить другим способом. Рассмотрим ряд

$$\frac{x}{\ln(1+x)} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{12}x^2 + \frac{1}{24}x^3 - \frac{19}{720}x^4 + \frac{3}{160}x^5 - \frac{863}{60480}x^6 + \dots,$$

который является обратным к ряду для логарифма, который мы рассматривали. Сравнивая эту формулу с (20), получаем выражение для общего члена этого ряда c_k и последовательности $s(n)$

$$c_k = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k \frac{S_1(k, j)}{j+1}, \quad s(n) = \sum_{k=0}^n c_k.$$

Последовательность $s(n)$ ускорим по ε -алгоритму как $s_1(n) = W(1, 2n)$, т.е. возьмем наддиагональную Паде-аппроксимацию. Но при вычислении цепной дроби будем использовать последовательность $1/s_1(n)$. Поэтому получим ту же дробь для $\ln 2$.

Эти манипуляции понадобились нам для того, чтобы установить связь между $\ln 2$ и константой Эйлера γ . Согласно изложенному выше

$$\frac{1}{\ln 2} = \sum_{k=0}^{\infty} c_k, \quad \gamma = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} c_k,$$

причем первый из этих рядов знакопеременный, а второй – знакостоянный.

Иррациональность $\ln 2$, впрочем, следует из обычной цепной дроби для $\ln(1+x)$. Применение qd -алгоритма (см. [30]) (который реализован в современных CAS) дает цепную дробь

$$\ln(1+x) = \frac{x}{1+} \frac{x}{2+} \frac{x}{3+} \frac{4x}{4+} \frac{4x}{5+} \frac{9x}{6+} \frac{9x}{7+} \frac{16x}{8+} \frac{16x}{9+} \dots,$$

которая обладает аппроксимационными свойствами, схожими с предыдущей.

Данный факт объясняется тем, что цепная дробь, полученная по qd -алгоритму, дает (через раз) диагональную и наддиагональную Паде-аппроксимации отрезков степенного ряда. Однако ε -алгоритм значительно проще и обладает большими возможностями.

Перейдем к изложению ρ -алгоритма, который обычно используют для ускорения монотонных последовательностей, для которых ε -алгоритм неэффективен. Однако, как мы увидим, ρ -алгоритм работает и для знакопеременных рядов (упоминание чего мы не нашли в литературе).

Пусть дана последовательность $s(n)$ (например, частичных сумм ряда s). Выберем последовательность $t(n)$, $n \in \mathbb{N}$, моделирующую скорость сходимости $s(n)$ к своему пределу. Таким образом, рассматриваются сходящиеся ряды или последовательности. Считается, что ρ -алгоритм не применим к расходящимся рядам, хотя доказательство этого факта мы не нашли в литературе.

В отличие от метода Ричардсона (см. разд. 3) последовательность $t(n)$ может стремиться к нулю, к бесконечности, а также быть осциллирующей в случае, если таковой является последовательность $s(n)$.

Построим двумерную таблицу $T(n, k)$, $n, k \in \mathbb{N}_0$, по рекуррентному соотношению

$$\begin{aligned} T(n, k) &= 0, \quad k < 0, \quad T(n, 0) = s(n), \\ T(n, k) &= T(n+1, k-2) + \frac{t(n+k) - t(n)}{T(n+1, k-1) - T(n, k-1)}, \quad k > 0, \end{aligned}$$

Мы использовали данное обозначение потому, что ρ -алгоритм, на самом деле, идентичен алгоритму Тиле построения интерполяционной рациональной аппроксимации в виде цепной дроби. Мы обнаружили данный факт эмпирически, но он, разумеется, уже известен (см. [32]).

Данное свойство ρ -алгоритма сразу показывает его сходство и отличие от метода Ричардсона. В отличие от последнего, ρ -алгоритм точен на последовательностях значений рациональных функций (а значит, и полиномиальных).

Однако, в отличие от ε -алгоритма, ρ -алгоритм не дает Паде-аппроксимаций отрезков ряда, а строит свои рациональные аппроксимации.

Дадим обобщение алгоритма Тиле для построения интерполирующей цепной дроби.

Выберем значение $p \in \{-1, 0, 1, 2, \dots\}$, которое является параметром. Пусть $s(n) = f(t(n+p))$, т.е. последовательность $s(n)$ является значениями функции $f(x)$ в точках $x = t(n+p)$, $n \in \mathbb{N}$. Положим

$$\begin{aligned} a_n &= x - t(n+p), \quad n \geq 1, \\ b_n &= T(p+1, n) - T(p+1, n-2), \quad n \geq 0. \end{aligned} \quad (25)$$

Тогда цепная дробь

$$f_n(x) = b_0 + \mathbf{K}_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k} \quad (26)$$

по построению является рациональной функцией и $f_n(x) = f(x)$ в узлах интерполяции $x \in \{t(p+1), t(p+2), \dots, t(p+n)\}$.

Таким образом, цепная дробь $f_n(x)$ обрывается в случае, если $f(x)$ является рациональной функцией.

Пусть теперь $\lim_{n \rightarrow \infty} t(n) = t_*$, где t_* пока конечно. Тогда бесконечная цепная дробь $f_\infty(t_*)$ сходится (вообще говоря) к значению $f(t_*)$. Например, при $t(n) \rightarrow 0$ для вычисления a_n и b_n сразу можно положить $x = 0$, и т.п.

Традиционно ρ -алгоритм используется при $t(n) \rightarrow \infty$, причем монотонно. Обычно берут $t(n) = n$ (что было в оригинальном ρ -алгоритме Винна (см. [33])). Так же как и для ε -алгоритма, вычисляются диагональные последовательности $T(j, 2n)$, но здесь $j \geq 0$. Величины $T(j, n)$ для нечетных n также являются вспомогательными.

Укажем на эквивалентность данного алгоритма алгоритму Тиле. Можно проверить, что

$$T(p+1, 2n) = \lim_{x \rightarrow \infty} f_{2n}(x), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Однако алгоритм Тиле является значительно более общим, так как $t(n)$ может стремиться к любому пределу, причем цепные дроби $f_{2n+1}(x)$ также имеют смысл.

Применим ρ -алгоритм для вычисления $\zeta(2)$ по ряду

$$\zeta(2) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}, \quad s(n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2},$$

который, как известно, сходится очень медленно (Базельская проблема).

Возьмем $t(n) = n$. Тогда для $s_0(n) = T(0, 2n)$ получим

$$\{s_0(n)\} = \left\{ \frac{5}{3}, \frac{125}{76}, \frac{8705}{5292}, \frac{10975}{6672}, \frac{13327519}{8102160}, \frac{124308457}{75570480}, \frac{19427741063}{11810650320}, \dots \right\},$$

с невязками

$$\begin{aligned} |s_0(10) - \zeta(2)| &< 0.44 \times 10^{-20}, \\ |s_0(40) - \zeta(2)| &< 0.90 \times 10^{-83}, \dots \end{aligned}$$

причем

$$\begin{aligned} |\text{num}(s_0(10)) - \text{den}(s_0(10))\zeta(2)| &< 0.11 \times 10^{-8}, \\ |\text{num}(s_0(40)) - \text{den}(s_0(40))\zeta(2)| &< 0.33 \times 10^{-17}, \dots, \end{aligned}$$

т.е. мы получили также ускорение сходимости в смысле Дирихле, т.е. критерий (1) выполнен. Это же относится к другим диагональным аппроксимациям, хотя, например, последовательность $s_1(n) = T(1, 2n)$ лучше приближает $\zeta(2)$ численно, но хуже в смысле Дирихле.

Данный алгоритм также демонстрирует чувствительность к выбору вспомогательной последовательности $t(n)$, что видно на следующем примере.

Применим ρ -алгоритм для вычисления $\zeta(3)$ по ряду

$$\zeta(3) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}, \quad s(n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3} \quad (27)$$

с той же последовательностью $t(n) = n$. Тогда получим примерно такой же результат ускорения сходимости численно (т.е. примерно с теми же невязками), что и для $\zeta(2)$, но непригодный в смысле Дирихле.

Возьмем теперь $t(n) = n(n+1)$. Тогда для $s_0(n) = T(0, 2n)$ получим

$$\{s_0(n)\} = \left\{ \frac{6}{5}, \frac{351}{292}, \frac{62531}{52020}, \frac{11424695}{9504288}, \frac{35441662103}{29484180000}, \frac{963652602684713}{801669704780000}, \dots \right\},$$

с невязками

$$\begin{aligned} |s_0(10) - \zeta(3)| &< 0.82 \times 10^{-30}, \\ |s_0(40) - \zeta(3)| &< 0.12 \times 10^{-121}, \dots \end{aligned}$$

причем

$$\begin{aligned} |\text{num}(s_0(10)) - \text{den}(s_0(10))\zeta(3)| &< 0.30 \times 10^{-7}, \\ |\text{num}(s_0(40)) - \text{den}(s_0(40))\zeta(3)| &< 0.90 \times 10^{-18}, \dots, \end{aligned}$$

т.е. мы экспериментально установили иррациональность $\zeta(2)$ и $\zeta(3)$ с помощью классического алгоритма ускорения сходимости.

Заметим, что если взять последовательность $t(n) = n^2$, которая асимптотически почти идентична предыдущей, то получим результат ускорения для $\zeta(3)$ значительно хуже, чем для $t(n) = n$ в численном смысле, и совершенно непригодный в смысле Дирихле. Например,

$$|s_0(10) - \zeta(3)| < 0.17 \times 10^{-6}, \quad \text{num}(s_0(10)) - \text{den}(s_0(10))\zeta(3) \approx -0.16 \times 10^{153}.$$

Данный факт еще раз показывает, что никаких априорных правил для выбора вспомогательной последовательности $t(n)$ пока что не существует, как и исследований в этом направлении.

Для строгого доказательства иррациональности $\zeta(2)$ и $\zeta(3)$ приведенных результатов, разумеется, недостаточно. Необходимо как минимум установить закономерности в последовательностях рациональных приближений.

Как и ранее, такие закономерности лучше видны в цепной дроби, полученной из последовательности рациональных приближений. Однако в отличие от ε -алгоритма для ρ -алгоритма (т.е. алгоритма Тиле) нет нужды использовать цепную дробь Эйлера. Можно сразу строить цепную дробь Тиле по формулам (25).

Дадим пример такой дроби для константы Апери $\zeta(3)$. Для $\zeta(2)$ результаты аналогичны, и мы их опускаем.

Для последовательности (27) возьмем параметр $p = 0$ и узлы интерполяции $t(n) = 1/n/(n + 1)$. Заметим, что выбор $t(n) = 1/n^2$ здесь также был бы крайне неудачным. Поскольку $t(n) \rightarrow 0$, то в (25) сразу можно положить $x = 0$. Тогда для $f_n(0)$ в (26) получим (после преобразования эквивалентности)

$$\zeta(3) = 1 + \frac{3}{16-} \frac{8}{7-} \frac{10}{176-} \frac{162}{19-} \frac{252}{936-} \frac{1440}{37-} \frac{1944}{3008-} \frac{7000}{61-} \frac{8800}{7400-} \cdots,$$

где $a_1 = 3$, $a_2 = -8$, и

$$a_n = \begin{cases} -(n-1)^3(n+2)(n+1)^2/64, & n \text{ odd} \\ -(n-1)(n+2)^3n^2/64, & n \text{ even,} \end{cases}$$

а также $b_0 = 1$, $b_1 = 16$, и

$$b_n = \begin{cases} (3n^2 + 6n - 1)(n+1)^2/4, & n \text{ odd} \\ (3n^2 + 6n + 4)/4, & n \text{ even.} \end{cases}$$

Цепная дробь Апери выводится гораздо более извилистым путем (см. [34]). Наша дробь обладает аппроксимационными свойствами, которые несколько уступают таковым у цепной дроби Апери, однако вполне достаточными для установления иррациональности $\zeta(3)$. Имеем

$$\begin{aligned} |f_{10}(0) - \zeta(3)| &< 0.60 \times 10^{-16}, \\ |f_{40}(0) - \zeta(3)| &< 0.64 \times 10^{-62}, \dots \end{aligned}$$

причем

$$\begin{aligned} |\text{num}(f_{10}(0)) - \text{den}(f_{10}(0))\zeta(3)| &< 0.24 \times 10^{-4}, \\ |\text{num}(f_{40}(0)) - \text{den}(f_{40}(0))\zeta(3)| &< 0.17 \times 10^{-10}, \dots \end{aligned}$$

Заметим также, что в алгоритме Тиле требуются диагональные последовательности вдвое меньшей длины, чем в ρ -алгоритме, так как там величины $T(j, 2n - 1)$ являются вспомогательными.

Приведем пример применения алгоритма Тиле к осциллирующей последовательности, что для ρ -алгоритма считается недопустимым. Возьмем произведение Валлиса

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2}{1} \frac{2}{3} \frac{4}{3} \frac{4}{5} \frac{6}{5} \frac{6}{7} \frac{8}{7} \frac{8}{9} \cdots,$$

где общий член c_n имеет вид

$$c_n = \begin{cases} (n+1)/n, & n \text{ odd} \\ n/(n+1), & n \text{ even.} \end{cases}$$

Заметим, что мы могли бы попарно перемножить соседние члены этого произведения и получить монотонную последовательность (и сходный результат). Но мы возьмем осциллирующую последовательность произведений c_n с узлами интерполяции $t(n) = (-1)^n/(n+1)$. Выбор $t(n) = (-1)^n/n$ здесь был бы крайне неудачным, что априори ниоткуда не следует.

Выберем параметр $p = 0$ и положим $x = 0$ в (25). Тогда для $f_n(0)$ в (26) получим (после преобразования эквивалентности)

$$\frac{\pi}{2} = 2 - \frac{2}{5-} \frac{2}{7-} \frac{9}{9-} \frac{9}{11-} \frac{20}{13-} \frac{20}{15-} \frac{35}{17-} \frac{35}{19-} \frac{54}{21-} \frac{54}{23-} \dots,$$

где закономерность в частных знаменателях очевидна, а для числителей

$$\{2, 9, 20, 35, 54, \dots\} = \{(n+1)(2n-1), n \in \mathbb{N}\}.$$

Данная цепная дробь лишь немного не дотягивает до критерия Дирихле (1). Имеем

$$\begin{cases} |f_{10}(0) - \frac{\pi}{2}| < 0.23 \times 10^{-8}, \\ |f_{20}(0) - \frac{\pi}{2}| < 0.44 \times 10^{-16}, \dots \end{cases}$$

причем

$$\begin{cases} |\text{num}(f_{10}(0)) - \text{den}(f_{10}(0))\frac{\pi}{2}| \approx 0.070606, \\ |\text{num}(f_{20}(0)) - \text{den}(f_{20}(0))\frac{\pi}{2}| \approx 0.031318, \dots \end{cases}$$

Наконец, применим алгоритм Тиле к ускорению последовательности (8) с тем же временем $t(n) = 1/n/(n+1)$. Тогда получим, что цепные дроби $f_{10}(0)$ дают лучшую оценку, чем (9), для $p = 0, 1, 2, \dots$. Причем порядок точности увеличивается вместе с p . Однако полученные дроби имеют очень большую длину, так что метод Ричардсона здесь более предпочтителен.

В заключение отметим, что представленные нами алгоритмы весьма просто реализуемы в современных CAS именно благодаря их рекурсивности.

В некоторых старых учебниках по численному анализу встречаются утверждения, что рекурсии в программах реализуются в виде циклов. Для современных CAS это, конечно, не так.

Рекурсии в CAS реализуются в виде внутренних таблиц, которые система строит и пополняет по мере надобности. Так что пользователю нет смысла резервировать память и самому организовывать вычисления. Можно просто обратиться к нужной величине.

Список литературы

- [1] *Cohen H., Villegas F.R., Zagier D.* Convergence Acceleration of Alternating Series // *Experimental Mathematics*, V. 9. N. 1. p. 3–12. (2000).
- [2] *Borwein J., Bailey D., Gigensohn R.* Experimentation in Mathematics: computational paths to discovery. A K Peters, Natick. (2004).
- [3] *Brezinski C.* Convergence acceleration during the 20th century // *Journal of Computational and Applied Mathematics*, V. 122. p. 1–21. (2000).
- [4] *van der Poorten A.* A proof that Euler missed... Apery's proof of the irrationality of $\zeta(3)$ // *The mathematical Intelligencer*, Berlin. V. 1. p. 195–203. (1978).
- [5] *Apéry R.* Irrationalité de $\zeta(2)$ et $\zeta(3)$ // *Astérisque*, V. 61, p. 11–13. (1979).
- [6] *Belabas K., Cohen H.* Numerical Algorithms for Number Theory. *Mathematical Surveys and Monographs*, V. 254. Amer. Math. Soc. (2021).
- [7] *Finch S. R.* *Mathematical Constants*. *Encycl. of Math. and its Appl.* 94, Cambridge Univ. Press. (2003).
- [8] *Weniger E.J.* Nonlinear sequence transformations for the acceleration of convergence and the summation of divergent series // *Computer Physics Report*. North-Holland. Amsterdam. V. 10. pp. 189–371. (1989).
- [9] *Weniger E.J.* Nonlinear sequence transformations for the acceleration of convergence and the summation of divergent series // [arXiv:math/0306302v1] (2003). (<http://arXiv.org/abs/math/0306302v1>).
- [10] *Brun V.* Ein Satz über Irrationalität // *Arkiv for Matematik og Naturvidenskab (Kristiania)*, V. 31. N. 3. p. 3–6. (1910).
- [11] *Perron O.* *Irrationalzahlen*. Göschens Lehrbücherei. Berlin, Leipzig. (1921).
- [12] *Legendre A.M.* *Èlements de Gèomètrie*. (2em. ed). Chez Fermin Didot Père et Fils. Paris. (1823).
- [13] *Perron O.* *Die Lehre von den Kettenbrüchen*. Teubner. Berlin. (1913).
- [14] *Brezinski C.* *History of Continued Fractions and Padé Approximants*. Springer Series in Computational Mathematics. V. 12. Springer-Verlag. Berlin, etc. (1991).

- [15] *Neville E.H.* Iterative interpolation // J. Indian Math. Soc. V. 20. pp. 87–120 (1934).
- [16] *Knopp K.* Theory and applications of infinite series. Blackie & Son. London. (1946).
- [17] *Варун В.П.* Факториальное преобразование некоторых классических комбинаторных последовательностей // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. Т.59. N 6. С. 1747-1770. (2018).
- [18] *Nielsen N.* Die Gammafunktion. Teubner, Leipzig, Berlin. (1906) = Chelsea, New York, (1965).
- [19] *Watson G. N.* The transformation of an asymptotic series into a convergent series of inverse factorials // Rend. Circ. Mat. Palermo. V. 34. pp. 41–88. (1912).
- [20] *Stieltjes T.J.* Recherches sur les fractions continues // Annales de la faculte des sciences de Toulouse 1re serie. V. 8. N. 4. pp. J1–J122. (1894) & 6e serie. V. 4. N. 4. pp. A5–A47. (1895).
- [21] *Euler L.* De seriebus divergentibus // Novi Comment. Acad. Sci. Petropolitanae. V. 5, pp. 205–237. (1754/55). reprint: Opera omnia. Ser. I. V. 14. Teubner, Leipzig. pp. 585–617. (1925).
- [22] Sloane online encyclopedia of integer sequences. (<http://oeis.org>).
- [23] *Gourdon X., Sebah P.* Collection of formulae for Euler’s constant γ // (numbers.computation.free.fr/Constants/constants.html). (2008).
- [24] *Kowalenko V.* Properties and Applications of the Reciprocal Logarithm Numbers // Acta Appl. Math. V. 109, pp. 413–437. (2010).
- [25] *Coffey M.W., Sondow J.* Rebuttal of Kowalenko’s paper as concerns the irrationality of Euler’s constant // [arXiv:1202.3093v2] (2012). (<http://arxiv.org/abs/1202.3093v2>).
- [26] *Aptekarev A.I.* On linear forms containing the Euler constant // [arXiv:0902.1768v2] (2009). (<http://arxiv.org/abs/0902.1768v2>).
- [27] *Хованский А.Н.* Приложение цепных дробей к вопросам приближенного анализа. Гос. издат. технико-теоретической лит. Москва. (1956).
- [28] *Cuyt A., et all.* Handbook of Continued Fractions for Special Functions. Springer. (2008).

- [29] *Press W. H., et all.* Numerical Recipes. The Art of Scientific Computing, 3rd ed. Cambridge University Press. (2007).
- [30] *Wimp J.* Sequence transformations and their applications. Academic Press. New-York. etc. (1981).
- [31] *Wynn P.* On the Convergence and Stability of the Epsilon Algorithm // SIAM Journal on Numerical Analysis. V. 3. N. 1. pp. 91–122 (1966).
- [32] *Brezinski C., Norman F.A., Redivo-Zaglia M.* The Legacy of Peter Wynn // Mathematics. V. 9. N. 1240. pp. 1–45. (2021). (<https://www.mdpi.com/journal/mathematics>).
- [33] *Wynn P.* On a Procrustean technique for the numerical transformation of slowly convergent sequences and series // Proc. Cambridge Phil. Soc. V. 52. pp. 663–671. (1956).
- [34] *Cohen H.* Demonstration de l'irrationalite de $\zeta(3)$ (d'apres R. Apery) // Seminaire de theorie des nombres de Grenoble, V. 6. exp.N. 6. pp. 1–9. (1977-1978).